

Ar žinote žarnyno vėžio požymius ir simptomus ?



Bowel Cancer Screening (Lithuanian)

Norėdami sužinoti apie žarnyno vėžį, turite pažinti savo kūną, kad anksti galėtumėte pastebėti visus pakyčius.


- Kraujavimas iš užpakalio ir/ar kraujas išmatose
- Tuštinimosi įpročių pasikeitimas (tualetu reikalų) užsitęsęs daugiau negu 4 savaites
- Vandeningos išmatos arba vandeningos išmatos esant vidurių užkietėjimui (vidurių užkietėjimas be kitų požymių mažiau tikėtina kad būtų rimta liga)
- Nesistengdami numetėte svorio
- Žmonės jums sako kad atrodo išblyškęs ir jūs dažnai jaučiatės pavargęs
- Stiprus ir nepraeinantis skrandžio skausmas, ypač po valgio

Šiuos simptomus gali sukelti ne tik vėžys, bet ir kitos įvairios ligos. Jeigu pastebėjote bet kurį iš šių simptomų, svarbu pasakyti gydytojui, net jeigu ir reguliariai tikrinatės žarnyną.

Žarnyno pasitikrinimas gali išgelbėti jūsų gyvybę...

Atlikus testą kaip nurodyta testo rinkinyje ir gražinus rinkinį, žarnyno vėžys gali būti nustatytas ankstyvoje stadijoje. Testas taip pat gali padėti nustatyti kitus pokyčius, kurie gali išsivystyti į vėžį.

- Žarnyno vėžys yra **3čias** pagal dažnumą Grampian regiono vėžys
- 2017 m. beveik **400** žmonėms Grampian regione buvo diagnozuotas žarnyno vėžys
- Tai labiau būdinga vyresniems nei 50 metų žmonėms- ypač vyrams
- **9 iš 10** žmonių išgyvens žarnyno vėžį jei jis bus nustatytas pakankamai anksti

Vyrams ir moterims nuo 50 -74 metų amžiaus kas 2 metai yra siunčiamas testų rinkinys. 

Vyresni nei 75 metų vyrai ir moterys kas dveji metai gali prašyti NEMOKAMO testo rinkinio. Skambinkite į Žarnyno patikrinimo centro pagalbos liniją – **0800 0121 833 (24 hours)**.

El Paštas: **TAY.scottishbowelscreening@nhs.scot**

Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite -
www.nhsinform.scot/screening